Zmiany skórne u dzieci

lek. Aleksandra Multan
Klinika Endokrynologii i Pediatrii DSK WUM



Zmiany skórne stanowią częsty problem, z jakim rodzice zgłaszają się z dzieckiem do pediatry.

Wykwity skórne mogą być objawem choroby skóry, tkanki podskórnej, a także chorób ogólnoustrojowych.



W czasie badania zwracamy uwagę na:

charakter zmian

rozmieszczenie
(zlokalizowane, rozsiane, symetryczne)


liczbę wykwitów

stan ogólny dziecka

Istotnym elementem diagnostyki wykwitów skórnych jest wywiad.


- okoliczności pojawienia się zmiany skórnej (samoistnie, po kontakcie)
- progresja zmian
- objawy towarzyszące (świąd, ból, gorączka)
- obecność podobnych zmian u osób z kontaktu
- przyjmowane leki
- podróże zagraniczne

KLASYFIKACJA ZMIAN SKÓRNYCH




Podział wykwitów skórnych

Pierwotne – bezpośredni wynik procesu chorobowego w skórze:



Plamka

zmiana zabarwienia skóry, niewyczuwalna w dotyku, o średnicy do 1 cm




Plama

zmiana zabarwienia skóry, niewyczuwalna w dotyku, o średnicy > 1 cm;


Podział wykwitów skórnych

Pierwotne – bezpośredni wynik procesu chorobowego w skórze:



Grudka

zmiana powierzchowna, uniesiona ponad powierzchnię skóry, wyczuwalna dotykiem, o średnicy nieprzekraczającej 1 cm




Blaszka


zmiana powierzchowna, uniesiona ponad powierzchnię skóry bądź gromada grudek o łącznej średnicy > 1 cm

Podział wykwitów skórnych

Pierwotne – bezpośredni wynik procesu chorobowego w skórze:




Pęcherzyk
wykwit uniesiony ponad powierzchnię skóry, wypełniony płynem, o średnicy < 1 cm




Pęcherz
wykwit uniesiony ponad powierzchnię skóry, wypełniony płynem, o średnicy > 1 cm

Podział wykwitów skórnych


Pierwotne – bezpośredni wynik procesu chorobowego w skórze:



Krostka, krosta
wykwit uniesiony ponad powierzchnię skóry, wypełniony ropą




Guzek, guz
wykwity uniesione ponad powierzchnię skóry, będące skutkiem procesu chorobowego w skórze właściwej



Bąbel
wykwit uniesiony ponad powierzchnię skóry, będący skutkiem obrzęku skóry właściwej, ustępujący (w okresie < 24 godz.)


Podział wykwitów skórnych

Wtórne – pojawiają się w wyniku przekształcania zmian pierwotnych lub jako efekt gojenia



Nadżerka

ubytek naskórka, ustępujący bez pozostawienia blizny




Owrzodzenie

ubytek naskórka i skóry właściwej, ustępujący z pozostawieniem blizny


Podział wykwitów skórnych

Wtórne – pojawiają się w wyniku przekształcania zmian pierwotnych lub jako efekt gojenia



Łuska

powstaje w wyniku niepełnego oddzielenia się powierzchniowych zrogowaciałych warstw naskórka




Strup

zaschnięta treść wysiękowa, ropna lub zakrzepła krew na powierzchni skóry

Podział wykwitów skórnych

Wtórne – pojawiają się w wyniku przekształcania zmian pierwotnych lub jako efekt gojenia



Blizna
tkanka łączna zastępująca uszkodzoną skórę



Pęknięcie, szczelina
szczelinowy ubytek, np. w kącikach ust, na dłoniach

ZMIANY SKÓRNE



Plama rumieniowa



Plama odbarwieniowa



Plama CAL (café-au-lait)




Wybroczyny





Znamię barwnikowe





Naczyniak płaski

(plama)



Naczyniak jamisty

(zmiana guzowata)



Pęcherzyk



Bąbel pokrzywkowy



Grudka



Krosta



Nadżerka



Owrzodzenie



Łuska



CZĘSTE ZMIANY SKÓRNE U DZIECI



Trądzik noworodkowy



Prosaki



ŁZS








AZS






Niemowlęta - zmiany grudkowo-wysiękowe
Małe dzieci (do 12 rż) - zmiany rumieniowo-grudkowe
Młodzież i dorośli - zmiany z tendencją do lichenizacji

Mięczak zakaźny



Brodawka wirusowa



Rumień wędrujący



Grzybica



Liszajec zakaźny

